

VERMITAN® 600 mg
Δισκία Albendazole για πρόβατα, αίγες

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικό συστατικό:
Albendazole.....600 mg

Έκδοχα.....έως.....1 δισκίο

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για τη θεραπεία παρασιτώσεων που προκαλούνται από ευαίσθητα στην αλβενδαζόλη στελέχη των παρακάτω παρασίτων.

Τρηματώδη παράσιτα: *Dicrocoelium dendriticum*, *Fasciola hepatica*.

Κεστώδη παράσιτα: *Moniezia expansa*, *Moniezia benedini*.

Νηματώδη παράσιτα: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia curticei*, *Nematodirus* spp., *Chabertia ovina*, *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens*, *Muellerius capillaris*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται κατά το πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης, καθώς και σε ζώα με υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσεως.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα – Αίγες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Vermitan δισκίο 600 mg χορηγείται από το στόμα.

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι:

3,8 - 5 mg αλβενδαζόλη / kg σ.β. (1/4 δισκίο Vermitan 600 mg / 40 kg σ.β.).

Όμως συνιστώνται:

7,5 mg αλβενδαζόλη / kg σ.β. (1/2 δισκίο Vermitan 600 mg / 40 kg σ.β.) κατά της πνευμονικής νηματωδίωσης από *Muellerius capillaris* ή *Protostrongylus rufescens*.

10 mg αλβενδαζόλη / kg σ.β. κατά της φασιόλωσης.
15 mg αλβενδαζόλη / kg σ.β. (1 δισκίο Vermitan 600 mg / 40 kg σ.β.) κατά της δικροκοιλίωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πρόβατα - Αίγες
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες.
Γάλα: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε χώρο ξηρό, θερμοκρασίας περιβάλλοντος και να προστατεύεται από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Δεν απαιτούνται.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Τα πρόσωπα που χειρίζονται το προϊόν να πλένουν τα χέρια τους μετά από την εφαρμογή της θεραπείας. Έγκυες γυναίκες και παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία
Να μη χορηγείται κατά το πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης.

Αλληλεπιδράσεις
Δεν έχουν παρατηρηθεί.

Υπερδοσολογία
Χορήγηση δόσης μεγαλύτερης από τη συνιστώμενη κατά 3,5 φορές στα πρόβατα και τις αίγες δεν προκάλεσε ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗ- ΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή άχρηστα υλικά που προέρχονται από τη χρήση του να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Η αλβενδαζόλη, ανθελμινθικό ευρέος φάσματος, προστατεύει από τις μολύνσεις από νηματώδη, τρηματώδη και κεστώδη. Ανάλογα με την εκάστοτε χορηγούμενη δόση, είναι δραστική κατά των προνυμφών και των ώριμων μορφών. Οι βασικοί μηχανισμοί δράσης της είναι η αναστολή του πολυμερισμού των μικροσωληναρίων, η αναστολή της πρόσληψης της γλυκόζης και η αναστολή της δράσης του ενζύμου αναγωγή της φουμαράσης.

Η αλβενδαζόλη απορροφάται από το γαστρεντερικό σωλήνα και μεταβολίζεται εκτενώς. Αν και παρατηρείται εντερο-ηπατικός κύκλος μεταβολισμού, η επίδρασή του στο ρυθμό αποβολής από τους ιστούς φαίνεται ότι είναι μικρή. Ο κύριος μεταβολίτης της, albendazole sulphoxide, έχει ανθελμινθική δράση και χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα του αίματος περίπου 8,5 ώρες, αποβάλλεται δε με το ούρο μαζί με άλλους μεταβολίτες.