

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ L.A. 20% / DOPHARMA Ενέσιμο διάλυμα

Οξυτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά ml)

Oxytetracycline base (ως dihydrate).....200 mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Χορηγείται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην οξυτετρακυκλίνη και ειδικότερα στις περιπτώσεις:

Αγελάδες: Ενδείξεις ανάπτυξης μητρίτιδας (γίνεται μία ένεση αμέσως μετά τον τοκετό)

Μόσχοι: Θεραπεία αναπνευστικών νοσημάτων (νόσος της μεταφοράς και πνευμονίας από *Pasteurella multocida* και *P. Haemolytica*), για τα οποία αρκεί η μία έγχυση. Θεραπεία πνευμονίας, που οφείλεται σε *Haemophilus pneumoniae* (μία έγχυση).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες. Να μη χορηγείται σε ζώα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- Αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
- Τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της ένεσης, ο οποίος παρέρχεται μέσα σε περίπου πέντε μέρες.
- Δυσχρωματισμός των αναπτυσσόμενων δοντιών.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Αγελάδες, μόσχοι, χοίροι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται εφάπαξ μόνο με ενδομυϊκή ένεση : 20 mg οξυτετρακυκλίνης / kg Σ.Β.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ποσότητες μεγαλύτερες των 10 ml θα πρέπει να ενίονται σε δύο διαφορετικές περιοχές

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας (βοοειδών-χοίρων): 28 ημέρες

Γάλα (αγελάδος) : 7 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Το προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια σε δροσερό μέρος. Μετά την πρώτη χρήση του το προϊόν παραμένει σταθερό για 30 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καμία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Φιαλίδιο 100 ml

Α.Μ.Κ.: 33463/04/28-2-2005 Κ-0066901