

zerofen 4%

1 kg + 10 kg CHANELLE

AMK 19903/29-02-2016

Σύνθεση σε δραστικά συστατικά και άλλες ουσίες (ανά g)

Δραστικό (ά)	Fenbendazole	0,04 g
Έκδοχα	q.s	1 g

Είδη ζώων για τα οποία προορίζεται

Χοίροι.



Ενδείξεις

Το ZEROFEN 4% σε σκόνη, είναι ένα ευρέος φάσματος ανθελμινθικό για τη θεραπεία των προσβεβλημένων χοίρων από ώριμες και άωρες μορφές νηματωδών ελμίνθων του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος: *Hyostrongylus rubius*, *Oesophagostomum spp.*, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus apri*.

Το προϊόν έχει ωοκτόνο επίδραση επί των αυγών των νηματωδών.

Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός(οι) χορήγησης

Το προϊόν σε σκόνη χορηγείται από το στόμα, αναμειγνυόμενο με την τροφή.

Η δόση χορήγησης είναι 5 mg φαινθενδαζόλης / kg Σ.Β. Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί στους χοίρους, είτε ως απλή δόση, είτε σε διαιρεμένη δοσολογία επί επτά ημέρες. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί στις χοιρομπτέρες επί δεκατέσσερις ημέρες. Όλες οι μέθοδοι θεραπείας είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Για τη θεραπεία των χοίρων που έχουν μολυνθεί με *Trichuris suis*, συνιστάται η δοσολογία να διαιρείται και να χορηγείται επί επτά ή δεκατέσσερις μέρες, για πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Για τη θεραπεία χοίρων που έχουν μολυνθεί με *Metastrongylus apri*, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 3 mg φαινθενδαζόλης/kg Σ.Β., ημερησίως επί τρεις ημέρες.

Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

Όταν ετοιμάζουμε φαρμακευτική τροφή για χοίρους, η οποία θα χορηγηθεί για πολλές ημέρες, συνιστάται πρώτα η ετοιμασία ενός προμίγματος για να εξασφαλιστεί η πλήρης διασπορά του φαρμάκου. Όταν ετοιμασθεί το πρόμιγμα, τότε αυτό στη συνέχεια αναμιγνύεται στην υπόλοιπη τροφή. Το προϊόν μπορεί να ενσωματωθεί σε τροφή προς σχηματισμό pellets, με ατμό θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερη από 45°C. Κάποιος παρασκευαστής πρέπει να είναι υπεύθυνος για την ανάμιξη, εφόσον η ενσωμάτωση είναι μικρότερη των δύο κιλών ανά τόνο τελικής τροφής.

Χρόνος αναμονής

Τα ζώα δεν πρέπει να σφάζονται προς ανθρώπινη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτά μπορούν να σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μόνο μετά την πάροδο περιόδου τριών (3) ημερών από την τελευταία θεραπευτική χορήγηση.

Ειδικές συνθήκες διατήρησης

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια σε θερμοκρασία 15-25°C.

Αναμειγμένο στην τελική τροφή παραμένει σταθερό επί ένα χρόνο.

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Η διάθεση των χρησιμοποιούμενων υλικών και περιεκτών να γίνεται με ασφάλεια. Να μη μολύνονται οι υδάτινες συλλογές ή οι υπαίθριοι χώροι με το προϊόν ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες.