PENICILLINE STREPTOMYCINE 200/200®

EOSC3424_003 R1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενέσιμο υδατικό εναιώρημα προκαϊνικής βενζυλοπενικιλλίνης και θειικής διυδροστρεπτομυκίνης.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Το σκεύασμα περιέχει ανά ml:
200 mg (=200.000 I.U.) προκαϊνικής βενζυλοπενικιλλίνης και 268,4 mg θειικής διυδροστρεπτομυκίνης (ισοδύναμα προς 200 mg διυδροστρεπτομυκίνης).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η διυδροστρεπτομυκίνη δρα εναντίον των αρνητικών κατά Gram βακτηριδίων περιλαμβανομένων των *Pasteurella, Brucella, Haemophilus, Salmonella, Klebsiella Shigella, Mycobacterium και E. Coli.*
Η βενζυλοπενικιλλίνη δρα εναντίον των στρεπτόκοκκων και σταφυλοκόκκων, *Corynebacterium pyogenes, Clostridium spp, Erysipelothrix rhusiopathiae, Actinomyces ovis, Leptospira canicola, Bacillus anthracis, Fusiformis nodosus* και *Nocardia spp.*

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην πενικιλλίνη και στη στρεπτομυκίνη σε βοοειδή, πρόβατα, ιπποειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες. Ο συνδυασμός πενικιλλίνης - στρεπτομυκίνης λόγω συνέργειας, είναι αποτελεσματικότερος από τη μεμονωμένη χορήγηση της κάθε μιας των παραπάνω δραστικών ουσιών. Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα πού βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή γαλουχία. Δεν παρατηρούνται τοξικές επιδράσεις στα έμβρυα αλλά ούτε και επηρεάζεται ο αριθμός των εμβρύων. Δεν παρατηρούνται παρενέργειες στα θηλάζοντα νεαρά ζώα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστό ιστορικό ευαισθησίας στην πενικιλλίνη ή στη στρεπτομυκίνη. Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις πού είναι γνωστό ότι στο ζώο υπάρχει η παρουσία μικροοργανισμών οι οποίοι παράγουν β-λακταμάση. Να μη χορηγείται ενδοφλέβια διότι είναι δυνατόν να προκληθεί ισχυρό αναφυλακτικό σοκ ή θρομβοφλεβίτιδα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Γενικά στους χοίρους, η χορήγηση σκευασμάτων πού περιέχουν προκαϊνική βενζυλοπενικιλλίνη, είναι πιθανό να προκαλέσει παροδικό πυρετό, ελαφριά αδιαθεσία, έμετο και ρίγη. Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν περιστασιακές αλλεργικές εκδηλώσεις οι οποίες οφείλονται στην πενικιλλίνη και αντιμετωπίζονται με τη χρήση αντιισταμινικών σκευασμάτων και επινεφρίνης. Σε περίπτωση υπερδοσίας στη στρεπτομυκίνη είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ωτοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιπποι	1 ml/25 kg σ.β. ενδομυϊκώς
Βοοειδή	1 ml/25 kg σ.β. ενδομυϊκώς
Πρόβατα	1 ml/20 kg σ.β. ενδομυϊκώς
Χοίροι	1 ml/20 kg σ.β. ενδομυϊκώς
Σκύλοι	1 ml/10 kg σ.β. ενδομυϊκώς ή υποδορίως
Γάτες	1 ml/10 kg σ.β. ενδομυϊκώς ή υποδορίως

Επαναληπτική χορήγηση μπορεί να γίνει μέχρι 3 φορές με μεσοδιάστημα 24 ωρών. Η επαναληπτική χορήγηση να μη διενεργείται στο ίδιο σημείο του σώματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Για το κρέας: 28 μέρες μετά την τελευταία χορήγηση. Για το γάλα: 3 μέρες (6 αμέλξεις μετά την τελευταία χορήγηση).

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Το προϊόν, καθώς και κάθε άλλο πού περιέχει πενικιλλίνη ή και στρεπτομυκίνη δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα αντιβακτηριακά σκευάσματα που έχουν βακτηριοστατική δράση π.χ. σουλφοναμίδες, χλωραμφενικόλη, τετρακυκλίνες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρατηρηθεί ανταγωνισμός. Ειναι δυνατό να αναπτυχθεί διασταυρούμενη μικροβιοαντοχή με άλλα αντιβιοτικά του β-λακταμικού δακτυλίου ή των αμινογλυκοσιδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ατομα ευαίσθητα στην πενικιλλίνη ή στη στρεπτομυκίνη να μην έρχονται σε δερματική επαφή, ούτε να χειρίζονται παρόμοια σκευάσματα. Σε περίπτωση ατυχήματος να πλένεστε με άφθονο νερό.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 15 ˚C. Μην το καταψύχετε. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 3 χρόνια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κυτίο με 12 γυάλινα ή PET φιαλίδια των 50 ml
Κυτίο με 12 γυάλινα ή PET φιαλίδια των 100 ml
Κυτίο με 1 γυάλινο ή PET φιαλίδιο των 100 ml

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το προϊόν χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου. Οπως όλα τα φάρμακα φυλάσσεται μακριά απο τα παιδιά.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας ΕοΦ Κ-2418 / 23.04.1991

Δικαιούχος:
Intervet International BV, Boxmeer, Ολλανδία
Παρασκευαστής – Συσκευαστής:
Intervet International BV, Boxmeer, Ολλανδία
Intervet Productions S.r.l., Aprilia, Ιταλία
Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Intervet Hellas A.E., Αγ. Δημητρίου 63, 174 55 Άλιμος

MSD
Animal Health